

N.	Domanda	A	B	C
2401	Come bisogna intervenire in caso di insufficienza respiratoria?	respirazione artificiale bocca a bocca	massaggio cardiaco	emostasi con laccio o con compressione digitale dell'arteria interessata
2402	Le emorragie meno gravi sono quelle:	venose	capillari	arteriose
2403	Si è in presenza di un soggetto ferito ma cosciente, e il primo soccorritore ha già contattato il Pronto Soccorso. In attesa dell'arrivo dei paramedici è consigliabile:	dar da bere al ferito, nel caso abbia sete ed eventualmente somministrare un antidolorifico, se accusa dolore	spostare il ferito in un luogo tranquillo e coprirlo con una coperta o una giacca	slacciare gli indumenti stretti (cintura o lacci, colletto, ecc.) per agevolare la respirazione, assistere il ferito, evitando di lasciarsi prendere dal panico
2404	Quali sono i sintomi che permettono di diagnosticare correttamente uno stato di incoscienza?	il soggetto non risponde agli stimoli vocali ma è sensibile agli stimoli fisici	il soggetto compie azioni pericolose per sé e per gli altri	il soggetto non risponde a nessuno stimolo, né vocale né fisico
2405	Una prima azione per verificare lo stato della circolazione sanguigna è:	Il numero delle respirazioni in 10 minuti	la misurazione del polso	il respiro affannoso
2406	I materiali presenti nella cassetta di pronto soccorso devono essere:	periodicamente controllati	reintegrati anche se non si usano	solo reintegrati perché se non si usano non c'è bisogno di controllarli
2407	In Italia, il Numero Unico di Emergenza è il:	112	non esiste un numero unico di emergenza	113
2408	Un condizione straordinaria che determina pericolo di vita e che rende necessario l'intervento terapeutico o ricorso a speciali mezzi di trattamento sanitario è una:	nessuna delle altre risposte	emergenza	situazione non urgente
2409	Una bambina di 7 anni ha riportato un lieve trauma cranico dopo aver battuto la testa contro uno spigolo. Il primo soccorritore deve:	trascinarla per i piedi in un angolo e darle da bere	in caso di emorragia dal naso, sollevare il soggetto e tapparle il naso per fermare l'emorragia	verificare se ha subito uno shock chiedendo di ripetere il proprio nome e se riesce a muovere gli arti quindi aiutarla a stendersi per terra
2410	In caso di avvelenamento da sostanze acide, quale delle seguenti è una controindicazione?	Somministrare il latte.	Provocare il vomito.	Avvisare un medico di emergenza.
2411	Contusioni, distorsioni, lussazioni e fratture sono lesioni:	dell'apparato cardio - circolatorio	dell'apparato scheletrico	dell'apparato muscolare e cerebrale
2412	Colui che effettua un intervento di primo soccorso, deve :	solo preoccuparsi di non arrecare ulteriori danni al ferito	fare solo quello che ha voglia di fare	anche preoccuparsi di non arrecare ulteriori danni al ferito
2413	Le ferite sono lesioni che coinvolgono:	solo i tessuti sottocutanei	cute, tessuti sottocutanei, muscoli, tendini e fasci nervosi	solo la cute
2414	Se lo svenimento è dovuto al caldo o ad altre cause ambientali bisogna:	tenere il soggetto con le gambe alzate su uno sgabello	tenere steso il soggetto sul luogo dell'evento	allontanare il soggetto dal luogo dell'evento
2415	Le cause all'origine di una insufficienza respiratoria sono:	insufficienza respiratoria, shock cardiogeno o ipovolemico, ischemia, embolia polmonare, intossicazione, lesioni neurologiche.	una diminuzione di globuli rossi circolanti.	ostruzione delle vie aeree, insufficienza respiratoria o cardiocircolatoria.
2416	Le contusioni possono essere di:	1°, 2°, 3°, 4° e 5° grado	1°, 2° e 3° grado	solo di 1° o 2° grado
2417	La misurazione del polso dell'infortunato ci consente di misurare:	quanti battiti compie il cuore in un minuto	quanti battiti compie il cuore in un'ora	non è una misurazione utile ai fini del primo soccorso
2418	Durante un intervento di Primo Soccorso su un soggetto affetto da soffocamento, l'infortunato è colto da svenimento e si accascia. In questo caso si raccomanda innanzitutto di:	sorreggere l'infortunato fino a stenderlo al suolo, e porlo in posizione laterale di sicurezza	caricare l'infortunato in automobile e portarlo al più vicino presidio di Pronto Soccorso	far sedere l'infortunato su una sedia comoda e chiamare immediatamente i soccorsi
2419	In caso di svenimento, quale fra le seguenti operazioni è meglio effettuare?	in caso di emorragia dal naso, sollevare il soggetto e tappare il naso per fermare l'emorragia	distendere il soggetto a terra e sollevargli le gambe	aiutare il soggetto a sedersi e svestirlo
2420	L'epistassi indica:	un taglio sulla pelle	la fuoruscita di sangue dal naso	la fuoruscita di sangue da un punto qualsiasi del corpo
2421	La respirazione faticosa a cui corrisponde un aumento dello sforzo respiratorio è la:	dispnea	apnea	convulsione
2422	La manovra di Heimlich non può essere utilizzata per i bambini:	più piccoli di un anno	più piccoli di tre anni	più grandi di 10 anni
2423	In caso di avvelenamento da sostanze caustiche è importante:	nessuna delle altre risposte	indurre il vomito	evitare il vomito
2424	L'alterazione dello stato di coscienza, pallore marcato, perdita di coscienza possono essere sintomi di:	distorsione	problema di lesioni allo scheletro	problema neurologico

N.	Domanda	A	B	C
2425	Uno solo, fra i seguenti dispositivi medici, non può assolutamente mancare in una cassetta per il Pronto Soccorso correttamente attrezzata, come previsto dalla Legge:	tuta sterile di tipo operatorio	siringhe ipodermiche sterili	compresse di garza sterile
2426	I dati che il soccorritore rileva osservando l'infortunato quali il colorito della pelle, la presenza di ferite o di ustioni, lo stato delle pupille sono:	funzioni vitali	segni	sintomi
2427	Per ossigenare il sangue pompato in modo meccanico, bisogna effettuare:	la manovra di G.A.S.	la manovra di Heimlich	la respirazione bocca a bocca
2428	Nel caso di emorragie arteriose l'intervento deve essere tempestivo perché la quantità di sangue:	molto elevata rispetto alle emorragie venose.	uguale a quella delle emorragie venose	meno elevata rispetto alle emorragie venose.
2429	Che cos'è la rinorragia?	fuoriuscita di sangue dalla bocca a seguito di vomito, proveniente dall'apparato digerente	fuoriuscita di sangue dalla bocca a seguito di un colpo di tosse, proveniente dalle vie respiratorie	fuoriuscita di sangue dalle cavità nasali
2430	Nel caso di dolore toracico profondo bisogna:	far distendere il soggetto e allentare abiti stretti	allentare gli abiti stretti e non è necessario far distendere il soggetto.	far distendere il soggetto e non è necessario allentare gli abiti stretti
2431	La gravità dell'avvelenamento dipende soprattutto dal:	tipo di sostanze ingerite	dal peso del soggetto avvelenato	dalla quantità di sostanza ingerita
2432	Normalmente, un individuo compie:	36/46 atti respiratori al minuto	12/16 atti respiratori al minuto	12/16 atti respiratori ogni 10 minuti
2433	In caso di avvelenamento da farmaci è importante:	non far addormentare il soggetto	nessuna delle altre risposte	far addormentare il soggetto
2434	Il primo soccorritore, dopo le prime manovre su un ferito contatta i paramedici al numero unico di emergenza. Durante la chiamata agli operatori del Pronto Soccorso, egli deve, fra le altre cose:	Spiegare bene l'accaduto, fornire il proprio recapito telefonico e mantenere aperta la linea, in modo da essere sempre in contatto con gli operatori di P.S.	rispondere con calma alle domande poste dall'operatore, fornire il proprio recapito telefonico, spiegare l'accaduto	spiegare il più velocemente possibile l'accaduto, quindi chiudere la chiamata: il ferito deve essere assistito!
2435	In caso di puntura da insetti:	non si deve strofinare la parte interessata	si deve strofinare la parte interessata	si deve strofinare la parte interessata senza cospargerla di ammoniaca
2436	Come si deve intervenire in caso di rinorragia?	applicazioni di acqua fredda, compressione dell'ala nasale contro il setto, tamponamento anteriore e posteriore	far succhiare del ghiaccio e applicare una borsa di ghiaccio sul torace, in posizione seduta	sdraiare semplicemente il paziente in decubito laterale sul lato interessato
2437	Se il soggetto è incosciente, bisogna valutare se sono presenti:	movimento, tosse e respiro	fame e sete	lentezza, sonno e fame
2438	In caso di emorragia venosa, il protocollo di intervento prevede:	unicamente la compressione diretta	sia la compressione diretta che il sollevamento dell'arto ferito	esclusivamente il sollevamento dell'arto ferito
2439	La respirazione artificiale deve essere praticata:	In tutti i casi di respiro assente o insufficiente	Nell'insufficienza respiratoria anche se di grado lieve	Solo se si eseguono anche le compressioni toraciche esterne
2440	Quando il sangue che fuoriesce è di colore scuro e fluisce lentamente e in modo continuo e uniforme lungo i bordi della ferita siamo in presenza di:	né l'una né l'altra risposta	un'emorragia arteriosa	un'emorragia venosa
2441	In presenza di un soggetto incosciente, il primo soccorritore, per verificare la funzionalità degli organi vitali, può applicare il metodo universale di valutazione ABC, nel quale è richiesto di:	controllare la presenza del battito cardiaco e chiamare più volte per nome il soggetto	controllare se le vie aeree sono libere e se sono presenti respiro e battito cardiaco	scuotere energicamente il paziente fino a farlo rinvenire
2442	Da taglio, da punta, da arma da fuoco, lacero contusa, abrasioni sono tutte classificazioni:	delle emorragie	delle ferite	delle infezioni
2443	Quali sono i principali sintomi che permetterebbero di diagnosticare rapidamente un disturbo cardiaco da angina pectoris?	dolore avuto allo sterno e al braccio sinistro, respiro affannoso, colorito cereo, labbra bluastre	dolore acuto o senso di oppressione al petto, braccio sinistro dolente, respiro superficiale	dolore acuto alla testa e al collo, respiro affannoso
2444	Da cosa si riconosce un'emorragia arteriosa?	Dal sangue di colore rosso scuro e a getto continuo	Dal sangue di colore rosso e a getto ritmico	Dal sangue di colore rosso vivo e a getto continuo
2445	Una persona perde conoscenza e sviene. I segni vitali sono presenti ma il soggetto non risponde agli stimoli. In questo caso è obbligatorio:	contattare immediatamente il numero unico di emergenza e attendere i soccorsi.	gridare a squarciagola chiamando aiuto e correre in strada	spostare il soggetto in un luogo sicuro, chiamare il numero unico di emergenza e attendere i soccorsi

N.	Domanda	A	B	C
2446	E' fondamentale che il soccorritore che presta il primo soccorso agisca in condizioni di:	economicità	sicurezza	emergenza
2447	Per evitare lesioni midollari, bisogna:	far sedere l'infortunato	mantenere il corpo in asse	spostare il corpo dal luogo dell'incidente
2448	Quando un capo articolare esce dalla propria articolazione senza tornare al suo posto si ha:	una distorsione	una lussazione	una contusione
2449	Quale scopo generale persegue il pronto soccorso?	Salvare la vita di bambini, donne e anziani	L'assistenza ai più indigenti	Salvare la vita, attenuare il dolore o il peggioramento di una malattia o trauma
2450	Se un paramedico ci chiede di applicare la regola detta "del 9" o "di Wallace" su un ferito, a che cosa si riferisce?	a una regola matematica applicata per classificare la gravità di un'ustione, valida esclusivamente per i bambini	a un sistema per valutare l'estensione di un'ustione rispetto alla superficie corporea	a un test per valutare lo stato di coscienza del soggetto, condotto facendo ripetere la tabellina del nove
2451	In presenza di un ferito incosciente, a prescindere dall'età del soggetto, si ha a disposizione un tempo limitato per ricercare segni vitali prima di attuare le pratiche di rianimazione. A quanto ammonta questo intervallo di tempo?	5 minuti	10 secondi	60 secondi
2452	Nell'effettuare un intervento di primo soccorso, il soggetto deve :	anche preoccuparsi di non fare male a se stesso	agire senza pensare	solo preoccuparsi di non fare male a se stesso
2453	Le ustioni sono lesioni:	della pelle	dei muscoli	delle ossa
2454	Un eritema è una ustione:	profonda di 2° grado	profonda di 3° grado	superficiale
2455	Le emorragie che si possono arginare, dopo una buona disinfezione, ponendo sulla ferita una garza sterile o un fazzoletto pulito e tamponando sono quelle:	venose	sia venose che arteriose	arteriose
2456	Prima di prestare soccorso per un soggetto ferito è buona norma:	entrare in contatto con il sangue fuoruscito	sfilare i guanti	infilare dei guanti
2457	Sangue, urine, feci, vomito, sperma, saliva configurano un rischio:	fisico	biologico	chimico
2458	La lettura di un manuale di primo soccorso è sufficiente per essere incaricato del primo soccorso in un'azienda. L'affermazione è:	falsa, perché bisogna avere un titolo di studio afferente l'area medico-sanitaria.	vera: basta dimostrare di averlo studiato!	falsa, perché è obbligatoria la frequenza di un corso di formazione ad hoc
2459	Per primo soccorso si intende un intervento da realizzarsi:	dopo che è arrivata l'unità di emergenza sanitaria	in attesa dell'arrivo dell'unità di emergenza sanitaria	nessuna delle altre risposte
2460	Dopo aver raccolto un cocchio spezzato dai bordi affilati, un bambino riporta una lesione da taglio al braccio destro. In questo caso, per evitare il diffondersi di infezioni si raccomanda di:	lavare la ferita con acqua e sapone neutro, sotto getto di acqua corrente e applicare alcool o tintura di iodio	lavare la ferita con acqua, asciugare con cura e soffiare sulla parte lesa per lenire il dolore	lavare la ferita con acqua e sapone neutro, sotto getto di acqua corrente e applicare acqua ossigenata
2461	Radiazioni, elettricità, incendi, rumori e vibrazioni, ambienti molto umidi molto caldi oppure molto freddi configurano un rischio:	chimico	biologico	fisico
2462	Chi presta il primo soccorso in caso di lussazione:	deve sempre cercare di ridurre la lussazione	deve valutare caso per caso	non deve mai cercare di ridurre l'articolazione
2463	La valutazione della gravità di un'ustione è data dalla:	dalla sola estensione	dalla sola profondità	profondità ed estensione
2464	Quando un soggetto può dirsi grave?	Esclusivamente quando è privo di coscienza	Quando sono compromesse le funzioni vitali	Quando non sono compromesse le funzioni vitali
2465	In caso di congelamento è utile:	esporre la parte congelata a fonte diretta di calore	nessuna delle altre risposte	massaggiare delicatamente la parte congelata
2466	Mentre si effettua un'operazione di respirazione artificiale, l'infortunato deve essere:	disteso, in posizione supina	seduto	disteso sul lato
2467	In quale circostanza il primo soccorritore dovrebbe evitare di porre un soggetto incosciente in posizione laterale di sicurezza?	In caso di sospette lesioni a carico del cranio o della colonna vertebrale	Nel caso in cui il paziente sia affetto da disabilità motoria	In presenza di perdita di sangue dal naso e dalla bocca
2468	Le pulsazioni cardiache di una vittima possono essere facilmente percepite:	sul collo o sul petto	solo sul petto	solo sul collo
2469	Il primo aiuto che si dà al ferito o a chi ha avuto improvvisamente un malore, prima che intervenga un esperto (medico o infermiere) o che arrivi l'autoambulanza è:	il codice rosso sanitario	il primo soccorso	il pronto soccorso

N.	Domanda	A	B	C
2470	Il mancato soccorso configura il reato di:	omissione di soccorso	prestazione di soccorso	omicidio colposo
2471	La manovra di G.A.S., prevista dal protocollo di primo soccorso, deve compiersi in:	100 secondi	10 minuti	10 secondi
2472	Come bisogna intervenire in caso di arresto cardiaco?	massaggio cardiaco e respirazione artificiale	emostasi con laccio o con compressione digitale dell'arteria interessata	respirazione artificiale bocca a bocca
2473	Un allontanamento temporaneo dei capi articolari dalla loro sede è una:	contusione	contusione di 2° grado	distorsione
2474	Caldo o freddo, sostanze chimiche, elettricità sono tutte cause di:	lussazioni	distorsioni	ustioni
2475	Le emorragie più gravi sono quelle:	arteriose	capillari	nessuna delle altre risposte
2476	Un'ostruzione delle vie aeree:	è sempre parziale	è sempre completa	può essere completa o parziale
2477	Di norma in presenza di un soggetto in stato di shock, è sempre necessario porre il paziente in posizione anti-shock (ovvero sollevando gli arti inferiori di almeno 45°), tranne che in un caso. Quale fra i seguenti?	in nessuno dei precedenti	in caso di shock cardiogeno, perché causerebbe sovraccarico di sangue	in caso di shock neurogeno, perché potrebbe causare scatti di rabbia nel paziente
2478	Il protocollo di intervento in caso di palpitazioni prevede:	l'immediato trasporto del soggetto al pronto soccorso, senza fare alcunché prima	subito la realizzazione di tecniche antishock	evitare sforzi, protezione termica
2479	Un bambino di 6 anni ha subito una ferita da taglio, che perde sangue copiosamente. Il primo soccorritore deve:	lavare la ferita con acqua, quindi applicare immediatamente un cerotto	tamponare la ferita, quindi lasciare che il sangue di arresti da solo lasciando la ferita aperta all'aria	tamponare la ferita con una garza pulita, esercitando una pressione finché il sangue non si arresta.
2480	Un'ustione da fuoco, di primo o di secondo grado, deve essere trattata	con prodotti farmaceutici specifici e applicando garze pulite sulla parte lesa	lavando la parte lesa con acqua fredda.	frizionando la parte lesa con abbondante olio di oliva
2481	Quale posizione si ritiene più opportuna nel primo soccorso di un ferito:	posizione di decubito, con le gambe sollevate in aria.	posizione di decubito prono-laterale, con il capo flesso.	posizione seduta.
2482	Secondo l'attuale normativa l'uso del defibrillatore semiautomatico è consentito:	a medici, infermieri e personale non sanitario qualificato	ai soli medici	ai soli infermieri
2483	In caso di ustioni superficiali è necessario:	detergere la parte con soluzione fisiologica	esporre la parte ustionata a un getto di acqua fredda	entrambe le altre risposte
2484	Il numero degli addetti al primo soccorso in un'azienda dipende:	dal volume di fatturato	dal numero complessivo dei dipendenti	dal tipo di produzione che realizza
2485	Per determinare l'estensione della superficie ustionata si utilizza la:	regola del 3	regola del 9	regola del 10
2486	Indicare quale fra le seguenti espressioni rappresenta la corretta descrizione della "manovra di Heimlich":	il soccorritore, posto alle spalle del soggetto, aggancia le braccia sotto al diaframma e dà un colpo secco verso l'alto	il soccorritore, posto davanti al soggetto, lo colpisce ripetutamente all'altezza dello sterno	il soccorritore china la testa del soggetto in avanti e dà un colpo secco fra le scapole
2487	La manovra di Heimlich è una manovra di:	disostruzione	tamponamento delle ferite	intervento in caso di avvelenamento di farmaci
2488	In Italia, il Numero Unico di Emergenza:	non esiste un numero unico di emergenza	è lo stesso sia per chiamate da cellulari che da telefono fisso	cambia a seconda se si chiama da un telefono fisso o da cellulare
2489	Indicare quale, fra i seguenti, è il metodo corretto per contrastare un ematoma dovuto all'impatto con un corpo contundente	massaggiare energicamente la parte colpita	applicare degli impacchi di acqua molto calda sulla parte colpita	applicare del ghiaccio sulla parte colpita
2490	Per legge, il personale che nelle diverse aziende, anche private, è incaricato al primo soccorso è:	un personale debitamente formato	un personale che ha un diploma di scuola superiore in materie sanitarie	Il personale che si rende disponibile al momento
2491	Il primo soccorso è anche quello prestato da personale specializzato?	No, affatto	No, quello offerto dai medici si definisce sempre "pronto soccorso"	Si, se esso viene offerto senza l'ausilio di mezzi adatti per un soccorso idoneo, mirato e tempestivo
2492	In caso di congelamento, bisogna:	somministrare bevande alcoliche	somministrare bevande calde e zuccherate	non far proprio bere nulla!
2493	A seconda che il sangue si riversi all'interno o all'esterno del corpo si ha:	un'emorragia esterna o interna	un'emorragia che per definizione è sempre esterna	un'emorragia che per definizione è sempre interna
2494	Se la ferita è piccola è sufficiente:	nessuna delle altre risposte	esercitare una forte pressione sul punto	usare cerotti

N.	Domanda	A	B	C
2495	Nel primo soccorso, le prime valutazioni da fare sono inerenti:	le vie aeree, il respiro e la circolazione	solo le vie aeree e il respiro	la circolazione, il respiro ma non le vie aeree
2496	Quando il sangue che fuoriesce è di colore rossastro e fuoriesce a gocce intorno alla lesione siamo in presenza di:	un'emorragia arteriosa	un'emorragia capillare	un'epistassi dalle orecchie
2497	Nel caso di avvelenamento da antiparassitari occorre:	far ingerire qualsiasi tipo di grassi perché impediscono l'assorbimento delle sostanze	far subito bere latte	evitare di far ingerire latte o grassi
2498	Tra le lesioni dell'apparato scheletrico, la più grave è:	la frattura	sia la frattura che la contusione	la lussazione e la contusione di 1° grado
2499	In caso di ostruzione delle vie aeree vanno effettuate:	manovre di G.A.S.	manovre di ostruzione	manovre di disostruzione
2500	La contusione va trattata in primo intervento con:	immobilizzazione con fasce e bende per 10 giorni	docce fredde	impacchi freddi e fasciatura della parte per qualche settimana
2501	Per primo soccorso di intende l'insieme di:	unicamente medici accorsi sul luogo dell'infortunio	strumenti sanitari da utilizzare al pronto soccorso	comportamenti, manovre e cure da effettuarsi nell'immediatezza dell'infortunio
2502	Per valutare l'attività respiratoria, devo applicare la regola sintetizzata nell'acronimo:	S.G.A.	G.A.D	G.A.S
2503	Tra l'altro, si possono distinguere le emorragie:	solo arteriose	venose e arteriose	solo venose
2504	L'entità e la criticità dell'intervento che si sta effettuando sono indicate:	da una password personale	da un codice, solitamente collegato a un colore	da un codice, solitamente collegato al peso della vittima
2505	L'insieme degli atti che personale non medico può mettere in atto in attesa dell'arrivo di personale più qualificato è:	il primo soccorso	il pronto soccorso	il primo soccorso socio-assistenziale
2506	Se sono assenti respiro e il soggetto è incosciente, è probabile che il soccorritore debba effettuare un intervento di:	rianimazione cardio polmonare	manovra di Heimlich	nessun intervento: va solo chiamata subito l'ambulanza
2507	In caso di arresto cardiaco bisogna effettuare subito:	solo il massaggio cardiaco	il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale	la respirazione artificiale, attendendo il medico per il massaggio cardiaco
2508	Le informazioni da dare subito all'operatore del numero di emergenza sono:	la narrazione dell'evento, il luogo non è importante	il luogo dell'evento, la narrazione dell'evento e chi è la vittima	solo il luogo dell'evento
2509	Se si sospetta una frattura della colonna vertebrale è fondamentale:	far muovere il soggetto	tenere immobile il soggetto	fare un massaggio cardiaco al soggetto
2510	Quando il sangue che fuoriesce ha un colore rosso vivo e fuoriesce "a spruzzi siamo in presenza di:	un'emorragia arteriosa	un'emorragia capillare	un'emorragia venosa
2511	Il protocollo di intervento in caso di folgorazione prevede:	utilizzare materiale isolante	entrambe le altre risposte	interruzione del flusso elettrico
2512	Per quale motivo il primo soccorritore dovrebbe sempre porre un soggetto incosciente in posizione laterale di sicurezza?	Per evitare che il paziente al risveglio risenta di traumi da postura scorretta	Per evitare che la lingua ostruisca le vie aeree e facilitare la fuoriuscita di liquidi (vomito, sangue, ecc.)	In modo che i soccorritori paramedici identifichino i pazienti che non hanno subito traumi ossei
2513	La "scena" ove si è svolto un incidente ha una sua importanza?	Sì, perché può fornire elementi utili al soccorso	Sì, perché la sola osservazione della scena basta a prestare soccorso.	No, perché ciò che è importante è l'evento accaduto non la scena
2514	Incidenti con autocisterne e fumi sprigionati da incendi configurano un rischio:	fisico	biologico	chimico
2515	Una condizione ordinaria che non determina un pericolo di vita immediato ma che rende necessario entro breve tempo l'intervento terapeutico è una:	situazione urgente	emergenza socio-sanitaria	situazione non urgente
2516	Cosa può avere causato una ostruzione nelle vie aeree?	rottura o alterazione della permeabilità della parete di un vaso sanguigno.	trauma al torace o all'addome.	presenza di un corpo estraneo in laringe o retroflessione della lingua.
2517	Il fatto che il paziente è cosciente e parla è segno che:	le vie aeree non sono libere	le vie aeree sono libere	la circolazione è libera
2518	Tra le attrezzature di Primo Soccorso dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire anche il DAE, ovvero:	il Defibrillatore Semiautomatico Esterno	il Defibrillatore Semiautomatico Interno	il Defibrillatore Semplice Esterno

N.	Domanda	A	B	C
2519	In caso di ferita provocata da oggetto conficcato nel corpo è necessario:	evitare di rimuovere gli oggetti conficcati	evitare di lasciare l'oggetto conficcato	rimuovere subito gli oggetti conficcati
2520	Azioni atte a valutare lo stato dell'infortunato e a mantenere le funzioni vitali in attesa dell'arrivo dei soccorsi sono indicate con l'acronimo:	G.A.D.	P.L.G.	BLS
2521	Durante una gita in campagna, un bambino viene punto da una vespa. Quale fra le seguenti azioni descrive il giusto tipo di trattamento di primo soccorso?	lavare la ferita con abbondante acqua fredda e sapone, e preparare impacchi con ghiaccio per ridurre il gonfiore	succhiare via dalla ferita il veleno con la bocca	togliere il pungiglione con una pinzetta, quindi spremere la ferita per far uscire il veleno
2522	L'insieme delle tecniche mediche, chirurgiche e farmaceutiche che vengono messe in atto da personale medico qualificato è:	il pronto soccorso	l'emergenza socio-sanitaria	il primo soccorso
2523	Cosa bisogna fare in caso di presenza di un corpo estraneo nella laringe?	massaggio cardiaco	respirazione artificiale bocca a bocca	estrometterlo con una forte e brusca compressione all'epigastrio e poi lateralizzare il capo
2524	Come bisogna intervenire in caso di emorragia esterna?	con il massaggio cardiaco e respirazione artificiale bocca a bocca	con la tecnica antishock	con emostasi con laccio o compressione digitale dell'arteria interessata
2525	Durante una gita in montagna, una studentessa decide di tuffarsi in una polla di acqua molto fredda. Dopo 20 minuti di esposizione la ragazza cade in ipotermia e uscendo si accascia a terra. Indicare il migliore trattamento possibile fra i seguenti.	togliere gli indumenti bagnati, e lasciare asciugare il soggetto al sole	togliere gli indumenti bagnati, coprire il soggetto con una o più coperte e incoraggiarlo a correre per scaldarsi	togliere gli indumenti bagnati, coprire il soggetto con una o più coperte, asciugare la pelle e somministrare bevande calde
2526	Una situazione ordinaria che necessità di trattamento medico ma che non richiede nessuna priorità è una:	situazione non urgente	situazione urgente	emergenza
2527	La manovra di G.A.S. prevista dal protocollo del soccorritore consiste nel:	guardare, assistere, salvare	guardare, ascoltare, sentire	guidare, assistere, sentire
2528	Le ferite possono generare:	solo infezioni	soprattutto emorragie	infezioni ed emorragie
2529	Il primo soccorritore, in presenza di un soggetto incosciente, deve innanzitutto verificare la presenza del battito cardiaco. Ciò può essere fatto:	esercitando una pressione con due dita sulla carotide, sul polso o sul braccio sinistro	esercitando una pressione con due dita sulla caviglia	appoggiando l'orecchio sul torace
2530	Che cosa s'intende con "tecniche di pronto soccorso"?	tecniche di assistenza di primo soccorso in caso di incidenti e malattie improvvise e d'emergenza	tecniche infermieristiche per una prima diagnosi	tecniche infermieristiche per la cura di bambini, donne o anziani
2531	La manifestazione estrema di reazione allergica è comunemente detta:	shock nervoso	trauma da stress	shock anafilattico
2532	In caso di svenimento e di polso debole bisogna:	mantenere disteso il soggetto	far sollevare le gambe del soggetto svenuto	far sollevare il torso del soggetto
2533	La manovra di Heimlich non può essere utilizzata per i bambini:	in stato di coscienza	in stato di incoscienza	la manovra in assoluto non si usa per i bambini!
2534	La prima cosa da fare è far sedere il colpito con la schiena eretta e con la testa flessa in avanti e fargli stringere le narici tra le dita. Ci riferiamo a un intervento in caso di:	entrambe le altre risposte	rinoraggia	epistassi
2535	Dopo una brutta caduta, un bambino riporta una frattura all'avambraccio destro, e, a causa del dolore, mostra una forte agitazione. Qual è la prima operazione che il primo soccorritore dovrebbe fare in attesa dell'arrivo dei soccorritori paramedici?	nessuna operazione in particolare	rimettere l'arto in posizione corretta manipolando le ossa	immobilizzare l'arto fratturato con cautela, impiegando una o più stecche rigide e una fascia
2536	Se siamo in presenza di traumi leggeri si può:	tenere immobile il soggetto e valutare lo stato di coscienza	un trauma è sempre grave!	tenere del ghiaccio sulla parte traumatizzata
2537	Come occorre intervenire in caso di punture di insetti?	Terapia antistaminica e antishock	Disinfettare la parte ed estrarre il pungiglione	Immobilizzazione della ferita e applicazione dell'antirabbica
2538	Le contusioni di 1° grado sono quelle:	che producono un ematoma	che producono una necrosi cutanea	in cui vengono lesi solo i piccoli vasi
2539	Quale fra i seguenti traumi e ferite può essere ragionevolmente identificato come "trauma maggiore", per il quale è richiesto l'immediato intervento di soccorritori specializzati?	ustione di 2° o 3° grado con superficie coinvolta superiore al 30% del totale	lussazione di una articolazione	disorientamento da shock, a seguito di un incidente

N.	Domanda	A	B	C
2540	Per ripristinare l'attività cardiaca, sarebbe utile saper utilizzare il:	il pace maker	defibrillatore	lo stetoscopio
2541	Condizione in cui una sostanza innocua viene riconosciuta come nociva per l'organismo è detta:	allergia	ustione	asma
2542	Un soggetto, dopo aver subito una o più punture da un insetto volante, presenta i seguenti sintomi: gonfiore della gola e della lingua, respiro sibilante, dolore al torace, nausea. A quale patologia sono presumibilmente associati tali sintomi?	A un comune colpo di calore	A nessuna patologia in particolare: sintomi simili sono tipici di una qualsiasi puntura d'insetto.	Allo shock anafilattico
2543	Che cosa si intende per "convulsioni"?	dolore acuto retrosternale che si diffonde al dorso, spalle e arto superiore	dolore ciclico localizzato nelle varie zone dell'addome	contrazioni muscolari rapide e involontarie
2544	Se il primo soccorritore è in presenza di un ferito in stato di incoscienza, in quale ordine è bene che esegua le varie fasi che costituiscono l'esame delle funzioni vitali?	stato di coscienza, attività respiratoria, attività cardio-circolatoria	non è previsto un ordine specifico delle fasi, che possono essere eseguite in qualsiasi ordine	attività respiratoria, attività cardio-circolatoria, stato di coscienza
2545	Un soggetto ha subito un forte trauma al fianco sinistro, con formazione di ematoma superficiale. In che modo si può diagnosticare rapidamente la presenza di una emorragia interna, in assenza di fuoriuscita di sangue?	verificando la presenza di sensibilità della pelle a valle dell'ematoma	verificando la presenza di sintomi da shock: pallore, tremito, polso frequente, respiro accelerato	esercitando una pressione sull'ematoma con le dita
2546	Nel controllo del respiro, per il primo soccorso, bisogna anche stimare:	quante respirazioni fa la vittima in un' ora	quante respirazioni fa la vittima in un minuto	quante respirazioni fa la vittima in un quarto d'ora
2547	Il vigente Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro impone che:	i posti di lavoro devono essere dotati di materiale di soccorso solo se hanno più di 100 dipendenti	i posti di lavoro devono essere dotati di infrastrutture e materiale di soccorso idonei alle emergenze	i datori di lavoro scelgano, a proprio giudizio, di quali materiali di soccorso devono dotarsi
2548	Cosa si intende per manovra MO.TO.RE.?	la verifica di presenza di movimenti, tosse e respiro	la riattivazione del circolo sanguigno periferico attuata muovendo gli arti inferiori del ferito	la manipolazione effettuata per verificare danni all'asse cranio-atlante-epistrofeo
2549	Chi si occupa del Pronto Soccorso?	Il soccorritore.	Il personale sanitario.	Un qualunque cittadino esperto.
2550	In cosa consiste la Manovra di Heimlich?	È una tecnica a promuovere l'espulsione della placenta	È una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree.	È una tecnica semeiologica di particolare utilità nel caso di tubercolosi

2401 A	2418 A	2435 A	2452 A	2469 B	2486 A	2503 B	2520 C	2537 B
2402 B	2419 B	2436 A	2453 A	2470 A	2487 A	2504 B	2521 A	2538 C
2403 C	2420 B	2437 A	2454 C	2471 C	2488 B	2505 A	2522 A	2539 A
2404 C	2421 A	2438 B	2455 A	2472 A	2489 C	2506 A	2523 C	2540 B
2405 B	2422 A	2439 A	2456 C	2473 C	2490 A	2507 B	2524 C	2541 A
2406 A	2423 C	2440 C	2457 B	2474 C	2491 C	2508 B	2525 C	2542 C
2407 A	2424 C	2441 B	2458 C	2475 A	2492 B	2509 B	2526 A	2543 C
2408 B	2425 C	2442 B	2459 B	2476 C	2493 A	2510 A	2527 B	2544 A
2409 C	2426 B	2443 B	2460 C	2477 B	2494 C	2511 B	2528 C	2545 B
2410 B	2427 C	2444 B	2461 C	2478 C	2495 A	2512 B	2529 A	2546 B
2411 B	2428 A	2445 A	2462 C	2479 C	2496 B	2513 A	2530 A	2547 B
2412 C	2429 C	2446 B	2463 C	2480 A	2497 C	2514 C	2531 C	2548 A
2413 B	2430 A	2447 B	2464 B	2481 B	2498 A	2515 A	2532 B	2549 B
2414 C	2431 A	2448 B	2465 C	2482 A	2499 C	2516 C	2533 B	2550 B
2415 C	2432 B	2449 C	2466 A	2483 C	2500 B	2517 B	2534 A	
2416 B	2433 A	2450 B	2467 A	2484 B	2501 C	2518 A	2535 C	
2417 A	2434 B	2451 B	2468 A	2485 B	2502 C	2519 A	2536 C	