

N.	Domanda	A	B	C
2101	Come si deve intervenire in caso di rinorragia?	far succhiare del ghiaccio e applicare una borsa di ghiaccio sul torace, in posizione seduta	sdraiare semplicemente il paziente in decubito laterale sul lato interessato	applicazioni di acqua fredda, compressione dell'ala nasale contro il setto, tamponamento anteriore e posteriore
2102	La misurazione del polso dell'infortunato ci consente di misurare:	quanti battiti compie il cuore in un minuto	non è una misurazione utile ai fini del primo soccorso	quanti battiti compie il cuore in un'ora
2103	L'entità e la criticità dell'intervento che si sta effettuando sono indicate:	da un codice, solitamente collegato a un colore	da un codice, solitamente collegato al peso della vittima	da una password personale
2104	Le emorragie più gravi sono quelle:	capillari	nessuna delle altre risposte	arteriose
2105	L'epistassi indica:	la fuoruscita di sangue dal naso	un taglio sulla pelle	la fuoruscita di sangue da un punto qualsiasi del corpo
2106	Indicare quale fra le seguenti espressioni rappresenta la corretta descrizione della "manovra di Heimlich":	il soccorritore china la testa del soggetto in avanti e dà un colpo secco fra le scapole	il soccorritore, posto alle spalle del soggetto, aggancia le braccia sotto al diaframma e dà un colpo secco verso l'alto	il soccorritore, posto davanti al soggetto, lo colpisce ripetutamente all'altezza dello sterno
2107	Di norma in presenza di un soggetto in stato di shock, è sempre necessario porre il paziente in posizione anti-shock (ovvero sollevando gli arti inferiori di almeno 45°), tranne che in un caso. Quale fra i seguenti?	in caso di shock neurogeno, perché potrebbe causare scatti di rabbia nel paziente	in nessuno dei precedenti	in caso di shock cardiogeno, perché causerebbe sovraccarico di sangue
2108	Un allontanamento temporaneo dei capi articolari dalla loro sede è una:	contusione di 2° grado	contusione	distorsione
2109	Per ripristinare l'attività cardiaca, sarebbe utile saper utilizzare il:	lo stetoscopio	il pace maker	defibrillatore
2110	Incidenti con autocisterne e fumi sprigionati da incendi configurano un rischio:	fisico	biologico	chimico
2111	Se il soggetto è incosciente, bisogna valutare se sono presenti:	lentezza, sonno e fame	fame e sete	movimento, tosse e respiro
2112	Il fatto che il paziente è cosciente e parla è segno che:	le vie aeree sono libere	le vie aeree non sono libere	la circolazione è libera
2113	La manovra di Heimlich non può essere utilizzata per i bambini:	più piccoli di tre anni	più piccoli di un anno	più grandi di 10 anni
2114	La respirazione faticosa a cui corrisponde un aumento dello sforzo respiratorio è la:	dispnea	convulsione	apnea
2115	In caso di ustioni superficiali è necessario:	esporre la parte ustionata a un getto di acqua fredda	detergere la parte con soluzione fisiologica	entrambe le altre risposte
2116	Contusioni, distorsioni, lussazioni e fratture sono lesioni:	dell'apparato scheletrico	dell'apparato muscolare e cerebrale	dell'apparato cardio - circolatorio
2117	Per valutare l'attività respiratoria, devo applicare la regola sintetizzata nell'acronimo:	G.A.S	G.A.D	S.G.A.
2118	Durante un intervento di Primo Soccorso su un soggetto affetto da soffocamento, l'infortunato è colto da svenimento e si accascia. In questo caso si raccomanda innanzitutto di:	caricare l'infortunato in automobile e portarlo al più vicino presidio di Pronto Soccorso	far sedere l'infortunato su una sedia comoda e chiamare immediatamente i soccorsi	sorreggere l'infortunato fino a stenderlo al suolo, e porlo in posizione laterale di sicurezza
2119	Le contusioni di 1° grado sono quelle:	che producono un ematoma	che producono una necrosi cutanea	in cui vengono lesi solo i piccoli vasi
2120	In caso di arresto cardiaco bisogna effettuare subito:	la respirazione artificiale, attendendo il medico per il massaggio cardiaco	solo il massaggio cardiaco	il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale
2121	Una bambina di 7 anni ha riportato un lieve trauma cranico dopo aver battuto la testa contro uno spigolo. Il primo soccorritore deve:	trascinarla per i piedi in un angolo e darle da bere	verificare se ha subito uno shock chiedendo di ripetere il proprio nome e se riesce a muovere gli arti quindi aiutarla a stendersi per terra	in caso di emorragia dal naso, sollevare il soggetto e tapparle il naso per fermare l'emorragia
2122	Indicare quale, fra i seguenti, è il metodo corretto per contrastare un ematoma dovuto all'impatto con un corpo contundente	applicare degli impacchi di acqua molto calda sulla parte colpita	massaggiare energicamente la parte colpita	applicare del ghiaccio sulla parte colpita
2123	In caso di avvelenamento da sostanze caustiche è importante:	indurre il vomito	nessuna delle altre risposte	evitare il vomito
2124	Le emorragie che si possono arginare, dopo una buona disinfezione, ponendo sulla ferita una garza sterile o un fazzoletto pulito e tamponando sono quelle:	venose	sia venose che arteriose	arteriose

N.	Domanda	A	B	C
2125	Le pulsazioni cardiache di una vittima possono essere facilmente percepite:	sul collo o sul petto	solo sul collo	solo sul petto
2126	Tra le lesioni dell'apparato scheletrico, la più grave è:	la frattura	la lussazione e la contusione di 1° grado	sia la frattura che la contusione
2127	Un bambino di 6 anni ha subito una ferita da taglio, che perde sangue copiosamente. Il primo soccorritore deve:	lavare la ferita con acqua, quindi applicare immediatamente un cerotto	tamponare la ferita con una garza pulita, esercitando una pressione finché il sangue non si arresta.	tamponare la ferita, quindi lasciare che il sangue di arresti da solo lasciando la ferita aperta all'aria
2128	Condizione in cui una sostanza innocua viene riconosciuta come nociva per l'organismo è detta:	allergia	ustione	asma
2129	Per quale motivo il primo soccorritore dovrebbe sempre porre un soggetto incosciente in posizione laterale di sicurezza?	Per evitare che il paziente al risveglio risenta di traumi da postura scorretta	In modo che i soccorritori paramedici identifichino i pazienti che non hanno subito traumi ossei	Per evitare che la lingua ostruisca le vie aeree e facilitare la fuoriuscita di liquidi (vomito, sangue, ecc.)
2130	Per primo soccorso si intende un intervento da realizzarsi:	dopo che è arrivata l'unità di emergenza sanitaria	nessuna delle altre risposte	in attesa dell'arrivo dell'unità di emergenza sanitaria
2131	In presenza di un ferito incosciente, a prescindere dall'età del soggetto, si ha a disposizione un tempo limitato per ricercare segni vitali prima di attuare le pratiche di rianimazione. A quanto ammonta questo intervallo di tempo?	10 secondi	5 minuti	60 secondi
2132	I dati che il soccorritore rileva osservando l'infortunato quali il colorito della pelle, la presenza di ferite o di ustioni, lo stato delle pupille sono:	segni	sintomi	funzioni vitali
2133	La respirazione artificiale deve essere praticata:	In tutti i casi di respiro assente o insufficiente	Solo se si eseguono anche le compressioni toraciche esterne	Nell'insufficienza respiratoria anche se di grado lieve
2134	Dopo aver raccolto un cocchio spezzato dai bordi affilati, un bambino riporta una lesione da taglio al braccio destro. In questo caso, per evitare il diffondersi di infezioni si raccomanda di:	lavare la ferita con acqua, asciugare con cura e soffiare sulla parte lesa per lenire il dolore	lavare la ferita con acqua e sapone neutro, sotto getto di acqua corrente e applicare alcool o tintura di iodio	lavare la ferita con acqua e sapone neutro, sotto getto di acqua corrente e applicare acqua ossigenata
2135	Per determinare l'estensione della superficie ustionata si utilizza la:	regola del 3	regola del 10	regola del 9
2136	Che cosa si intende per "convulsioni"?	dolore ciclico localizzato nelle varie zone dell'addome	dolore acuto retrosternale che si diffonde al dorso, spalle e arto superiore	contrazioni muscolari rapide e involontarie
2137	Normalmente, un individuo compie:	12/16 atti respiratori al minuto	12/16 atti respiratori ogni 10 minuti	36/46 atti respiratori al minuto
2138	Per primo soccorso si intende l'insieme di:	unicamente medici accorsi sul luogo dell'infortunio	comportamenti, manovre e cure da effettuarsi nell'immediatezza dell'infortunio	strumenti sanitari da utilizzare al pronto soccorso
2139	Le emorragie meno gravi sono quelle:	capillari	venose	arteriose
2140	Se siamo in presenza di traumi leggeri si può:	tenere immobile il soggetto e valutare lo stato di coscienza	un trauma è sempre grave!	tenere del ghiaccio sulla parte traumatizzata
2141	Il primo soccorso è anche quello prestato da personale specializzato?	No, quello offerto dai medici si definisce sempre "pronto soccorso"	Si, se esso viene offerto senza l'ausilio di mezzi adatti per un soccorso idoneo, mirato e tempestivo	No, affatto
2142	Un eritema è una ustione:	profonda di 2° grado	profonda di 3° grado	superficiale
2143	Le contusioni possono essere di:	solo di 1° o 2° grado	1°, 2° e 3° grado	1°, 2°, 3°, 4° e 5° grado
2144	Che cos'è la rinorragia?	fuoriuscita di sangue dalle cavità nasali	fuoriuscita di sangue dalla bocca a seguito di un colpo di tosse, proveniente dalle vie respiratorie	fuoriuscita di sangue dalla bocca a seguito di vomito, proveniente dall'apparato digerente
2145	Come bisogna intervenire in caso di arresto cardiaco?	massaggio cardiaco e respirazione artificiale	respirazione artificiale bocca a bocca	emostasi con laccio o con compressione digitale dell'arteria interessata
2146	In Italia, il Numero Unico di Emergenza è il:	112	113	non esiste un numero unico di emergenza
2147	La "scena" ove si è svolto un incidente ha una sua importanza?	No, perché ciò che è importante è l'evento accaduto non la scena	Si, perché può fornire elementi utili al soccorso	Si, perché la sola osservazione della scena basta a prestare soccorso.
2148	Quando il sangue che fuoriesce è di colore rossastro e fuoriesce a gocce intorno alla lesione siamo in presenza di:	un'emorragia arteriosa	un'epistassi dalle orecchie	un'emorragia capillare

N.	Domanda	A	B	C
2149	Quando il sangue che fuoriesce ha un colore rosso vivo e fuoriesce "a spruzzi siamo in presenza di:	un'emorragia venosa	un'emorragia capillare	un'emorragia arteriosa
2150	Una condizione ordinaria che non determina un pericolo di vita immediato ma che rende necessario entro breve tempo l'intervento terapeutico è una:	situazione urgente	situazione non urgente	emergenza socio-sanitaria
2151	Durante una gita in montagna, una studentessa decide di tuffarsi in una polla di acqua molto fredda. Dopo 20 minuti di esposizione la ragazza cade in ipotermia e uscendo si accascia a terra. Indicare il migliore trattamento possibile fra i seguenti.	togliere gli indumenti bagnati, coprire il soggetto con una o più coperte e incoraggiarlo a correre per scaldarsi	togliere gli indumenti bagnati, coprire il soggetto con una o più coperte, asciugare la pelle e somministrare bevande calde	togliere gli indumenti bagnati, e lasciare asciugare il soggetto al sole
2152	Che cosa s'intende con "tecniche di pronto soccorso"?	tecniche infermieristiche per la cura di bambini, donne o anziani	tecniche di assistenza di primo soccorso in caso di incidenti e malattie improvvise e d'emergenza	tecniche infermieristiche per una prima diagnosi
2153	Se un paramedico ci chiede di applicare la regola detta "del 9" o "di Wallace" su un ferito, a che cosa si riferisce?	a un sistema per valutare l'estensione di un'ustione rispetto alla superficie corporea	a un test per valutare lo stato di coscienza del soggetto, condotto facendo ripetere la tabellina del nove	a una regola matematica applicata per classificare la gravità di un'ustione, valida esclusivamente per i bambini
2154	In caso di ostruzione delle vie aeree vanno effettuate:	manovre di ostruzione	manovre di disostruzione	manovre di G.A.S.
2155	In caso di avvelenamento da farmaci è importante:	nessuna delle altre risposte	non far addormentare il soggetto	far addormentare il soggetto
2156	Come occorre intervenire in caso di punture di insetti?	Immobilizzazione della ferita e applicazione dell'antirabbica	Disinfettare la parte ed estrarre il pungiglione	Terapia antistaminica e antishock
2157	La manovra di G.A.S., prevista dal protocollo di primo soccorso, deve compiersi in:	10 secondi	100 secondi	10 minuti
2158	Si è in presenza di un soggetto ferito ma cosciente, e il primo soccorritore ha già contattato il Pronto Soccorso. In attesa dell'arrivo dei paramedici è consigliabile:	dar da bere al ferito, nel caso abbia sete ed eventualmente somministrare un antidolorifico, se accusa dolore	spostare il ferito in un luogo tranquillo e coprirlo con una coperta o una giacca	slacciare gli indumenti stretti (cintura o lacci, colletto, ecc.) per agevolare la respirazione, assistere il ferito, evitando di lasciarsi prendere dal panico
2159	La manifestazione estrema di reazione allergica è comunemente detta:	shock anafilattico	shock nervoso	trauma da stress
2160	Nell'effettuare un intervento di primo soccorso, il soggetto deve :	agire senza pensare	anche preoccuparsi di non fare male a se stesso	solo preoccuparsi di non fare male a se stesso
2161	Se il primo soccorritore è in presenza di un ferito in stato di incoscienza, in quale ordine è bene che esegua le varie fasi che costituiscono l'esame delle funzioni vitali?	stato di coscienza, attività respiratoria, attività cardio-circolatoria	attività respiratoria, attività cardio-circolatoria, stato di coscienza	non è previsto un ordine specifico delle fasi, che possono essere eseguite in qualsiasi ordine
2162	Quando il sangue che fuoriesce è di colore scuro e fluisce lentamente e in modo continuo e uniforme lungo i bordi della ferita siamo in presenza di:	un'emorragia arteriosa	né l'una né l'altra risposta	un'emorragia venosa
2163	Le ferite sono lesioni che coinvolgono:	solo la cute	solo i tessuti sottocutanei	cute, tessuti sottocutanei, muscoli, tendini e fasci nervosi
2164	Il primo soccorritore, in presenza di un soggetto incosciente, deve innanzitutto verificare la presenza del battito cardiaco. Ciò può essere fatto:	esercitando una pressione con due dita sulla caviglia	appoggiando l'orecchio sul torace	esercitando una pressione con due dita sulla carotide, sul polso o sul braccio sinistro
2165	In caso di congelamento, bisogna:	somministrare bevande alcoliche	non far proprio bere nulla!	somministrare bevande calde e zuccherate
2166	Se sono assenti respiro e il soggetto è incosciente, è probabile che il soccorritore debba effettuare un intervento di:	nessun intervento: va solo chiamata subito l'ambulanza	rianimazione cardio polmonare	manovra di Heimlich
2167	Tra le attrezzature di Primo Soccorso dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire anche il DAE, ovvero:	il Defibrillatore Semiautomatico Esterno	il Defibrillatore Semplice Esterno	il Defibrillatore Semiautomatico Interno
2168	In caso di avvelenamento da sostanze acide, quale delle seguenti è una controindicazione?	Somministrare il latte.	Avvisare un medico di emergenza.	Provocare il vomito.
2169	Da taglio, da punta, da arma da fuoco, lacero contusa, abrasioni sono tutte classificazioni:	delle ferite	delle infezioni	delle emorragie

N.	Domanda	A	B	C
2170	Uno solo, fra i seguenti dispositivi medici, non può assolutamente mancare in una cassetta per il Pronto Soccorso correttamente attrezzata, come previsto dalla Legge:	compresse di garza sterile	tuta sterile di tipo operatorio	siringhe ipodermiche sterili
2171	Una persona perde conoscenza e sviene. I segni vitali sono presenti ma il soggetto non risponde agli stimoli. In questo caso è obbligatorio:	gridare a squarciagola chiamando aiuto e correre in strada	spostare il soggetto in un luogo sicuro, chiamare il numero unico di emergenza e attendere i soccorsi	contattare immediatamente il numero unico di emergenza e attendere i soccorsi.
2172	In caso di svenimento, quale fra le seguenti operazioni è meglio effettuare?	in caso di emorragia dal naso, sollevare il soggetto e tappare il naso per fermare l'emorragia	distendere il soggetto a terra e sollevargli le gambe	aiutare il soggetto a sedersi e svestirlo
2173	Il mancato soccorso configura il reato di:	prestazione di soccorso	omicidio colposo	omissione di soccorso
2174	L'alterazione dello stato di coscienza, pallore marcato, perdita di coscienza possono essere sintomi di:	problema neurologico	distorsione	problema di lesioni allo scheletro
2175	Prima di prestare soccorso per un soggetto ferito è buona norma:	infilare dei guanti	entrare in contatto con il sangue fuoriuscito	sfilare i guanti
2176	Sangue, urine, feci, vomito, sperma, saliva configurano un rischio:	chimico	biologico	fisico
2177	Cosa bisogna fare in caso di presenza di un corpo estraneo nella laringe?	respirazione artificiale bocca a bocca	estrometterlo con una forte e brusca compressione all'epigastrio e poi lateralizzare il capo	massaggio cardiaco
2178	Le ferite possono generare:	infezioni ed emorragie	soprattutto emorragie	solo infezioni
2179	Radiazioni, elettricità, incendi, rumori e vibrazioni, ambienti molto umidi molto caldi oppure molto freddi configurano un rischio:	fisico	biologico	chimico
2180	Un soggetto ha subito un forte trauma al fianco sinistro, con formazione di ematoma superficiale. In che modo si può diagnosticare rapidamente la presenza di una emorragia interna, in assenza di fuoriuscita di sangue?	verificando la presenza di sensibilità della pelle a valle dell'ematoma	esercitando una pressione sull'ematoma con le dita	verificando la presenza di sintomi da shock: pallore, tremito, polso frequente, respiro accelerato
2181	In presenza di un soggetto incosciente, il primo soccorritore, per verificare la funzionalità degli organi vitali, può applicare il metodo universale di valutazione ABC, nel quale è richiesto di:	controllare la presenza del battito cardiaco e chiamare più volte per nome il soggetto	controllare se le vie aeree sono libere e se sono presenti respiro e battito cardiaco	scuotere energicamente il paziente fino a farlo rinvenire
2182	In caso di congelamento è utile:	nessuna delle altre risposte	massaggiare delicatamente la parte congelata	esporre la parte congelata a fonte diretta di calore
2183	Per legge, il personale che nelle diverse aziende, anche private, è incaricato al primo soccorso è:	un personale che ha un diploma di scuola superiore in materie sanitarie	un personale debitamente formato	Il personale che si rende disponibile al momento
2184	Una prima azione per verificare lo stato della circolazione sanguigna è:	il respiro affannoso	la misurazione del polso	Il numero delle respirazioni in 10 minuti
2185	Se la ferita è piccola è sufficiente:	nessuna delle altre risposte	esercitare una forte pressione sul punto	usare cerotti
2186	Azioni atte a valutare lo stato dell'infortunato e a mantenere le funzioni vitali in attesa dell'arrivo dei soccorsi sono indicate con l'acronimo:	BLS	P.L.G.	G.A.D.
2187	A seconda che il sangue si riversi all'interno o all'esterno del corpo si ha:	un'emorragia che per definizione è sempre esterna	un'emorragia esterna o interna	un'emorragia che per definizione è sempre interna
2188	Per evitare lesioni midollari, bisogna:	spostare il corpo dal luogo dell'incidente	far sedere l'infortunato	mantenere il corpo in asse
2189	Le ustioni sono lesioni:	delle ossa	della pelle	dei muscoli
2190	Durante una gita in campagna, un bambino viene punto da una vespa. Quale fra le seguenti azioni descrive il giusto tipo di trattamento di primo soccorso?	succhiare via dalla ferita il veleno con la bocca	lavare la ferita con abbondante acqua fredda e sapone, e preparare impacchi con ghiaccio per ridurre il gonfiore	togliere il pungiglione con una pinzetta, quindi spremere la ferita per far uscire il veleno
2191	Le cause all'origine di una insufficienza respiratoria sono:	insufficienza respiratoria, shock cardiogeno o ipovolemico, ischemia, embolia polmonare, intossicazione, lesioni neurologiche.	ostruzione delle vie aeree, insufficienza respiratoria o cardiocircolatoria.	una diminuzione di globuli rossi circolanti.

N.	Domanda	A	B	C
2192	Da cosa si riconosce un'emorragia arteriosa?	Dal sangue di colore rosse e a getto ritmico	Dal sangue di colore rosso scuro e a getto continuo	Dal sangue di colore rosso vivo e a getto continuo
2193	Le informazioni da dare subito all'operatore del numero di emergenza sono:	il luogo dell'evento, la narrazione dell'evento e chi è la vittima	solo il luogo dell'evento	la narrazione dell'evento, il luogo non è importante
2194	Quale fra i seguenti traumi e ferite può essere ragionevolmente identificato come "trauma maggiore", per il quale è richiesto l'immediato intervento di soccorritori specializzati?	disorientamento da shock, a seguito di un incidente	ustione di 2° o 3° grado con superficie coinvolta superiore al 30% del totale	lussazione di una articolazione
2195	Come bisogna intervenire in caso di insufficienza respiratoria?	emostasi con laccio o con compressione digitale dell'arteria interessata	massaggio cardiaco	respirazione artificiale bocca a bocca
2196	Colui che effettua un intervento di primo soccorso deve :	solo preoccuparsi di non arrecare ulteriori danni al ferito	anche preoccuparsi di non arrecare ulteriori danni al ferito	fare solo quello che ha voglia di fare
2197	In caso di ferita provocata da oggetto conficcato nel corpo è necessario:	evitare di rimuovere gli oggetti conficcati	rimuovere subito gli oggetti conficcati	evitare di lasciare l'oggetto conficcato
2198	Nel caso di emorragie arteriose l'intervento deve essere tempestivo perché la quantità di sangue:	uguale a quella delle emorragie venose	meno elevata rispetto alle emorragie venose.	molto elevata rispetto alle emorragie venose.
2199	E' fondamentale che il soccorritore che presta il primo soccorso agisca in condizioni di:	sicurezza	emergenza	economicità
2200	La manovra di Heimlich non può essere utilizzata per i bambini:	la manovra in assoluto non si usa per i bambini!	in stato di coscienza	in stato di incoscienza
2201	Nel caso di dolore toracico profondo bisogna:	far distendere il soggetto e allentare abiti stretti	far distendere il soggetto e non è necessario allentare gli abiti stretti	allentare gli abiti stretti e non è necessario far distendere il soggetto.
2202	Il primo aiuto che si dà al ferito o a chi ha avuto improvvisamente un malore, prima che intervenga un esperto (medico o infermiere) o che arrivi l'autoambulanza è:	il primo soccorso	il pronto soccorso	il codice rosso sanitario
2203	Un soggetto, dopo aver subito una o più punture da un insetto volante, presenta i seguenti sintomi: gonfiore della gola e della lingua, respiro sibilante, dolore al torace, nausea. A quale patologia sono presumibilmente associati tali sintomi?	A un comune colpo di calore	Allo shock anafilattico	A nessuna patologia in particolare: sintomi simili sono tipici di una qualsiasi puntura d'insetto.
2204	La gravità dell'avvelenamento dipende soprattutto dal:	tipo di sostanze ingerite	dal peso del soggetto avvelenato	dalla quantità di sostanza ingerita
2205	Cosa può avere causato una ostruzione nelle vie aeree?	presenza di un corpo estraneo in laringe o retroflessione della lingua.	trauma al torace o all'addome.	rottura o alterazione della permeabilità della parete di un vaso sanguigno.
2206	Mentre si effettua un'operazione di respirazione artificiale, l'infortunato deve essere:	disteso sul lato	seduto	disteso, in posizione supina
2207	La manovra di G.A.S. prevista dal protocollo del soccorritore consiste nel:	guidare,assistere,sentire	guardare, assistere, salvare	guardare, ascoltare, sentire
2208	Il protocollo di intervento in caso di palpitazioni prevede:	evitare sforzi, protezione termica	l'immediato trasporto del soggetto al pronto soccorso, senza fare alcunché prima	subito la realizzazione di tecniche antishock
2209	In caso di emorragia venosa, il protocollo di intervento prevede:	esclusivamente il sollevamento dell'arto ferito	unicamente la compressione diretta	sia la compressione diretta che il sollevamento dell'arto ferito
2210	Il primo soccorritore, dopo le prime manovre su un ferito contatta i paramedici al numero unico di emergenza. Durante la chiamata agli operatori del Pronto Soccorso, egli deve, fra le altre cose:	Spiegare bene l'accaduto, fornire il proprio recapito telefonico e mantenere aperta la linea, in modo da essere sempre in contatto con gli operatori di P.S.	rispondere con calma alle domande poste dall'operatore, fornire il proprio recapito telefonico, spiegare l'accaduto	spiegare il più velocemente possibile l'accaduto, quindi chiudere la chiamata: il ferito deve essere assistito!
2211	La manovra di Heimlich è una manovra di:	tamponamento delle ferite	intervento in caso di avvelenamento di farmaci	disostruzione
2212	La valutazione della gravità di un'ustione è data dalla:	dalla sola estensione	profondità ed estensione	dalla sola profondità
2213	Quando un capo articolare esce dalla propria articolazione senza tornare al suo posto si ha:	una lussazione	una distorsione	una contusione
2214	Quando un soggetto può dirsi grave?	Quando sono compromesse le funzioni vitali	Quando non sono compromesse le funzioni vitali	Esclusivamente quando è privo di coscienza

N.	Domanda	A	B	C
2215	Nel primo soccorso, le prime valutazioni da fare sono inerenti:	solo le vie aeree e il respiro	la circolazione, il respiro ma non le vie aeree	le vie aeree, il respiro e la circolazione
2216	La lettura di un manuale di primo soccorso è sufficiente per essere incaricato del primo soccorso in un'azienda. L'affermazione è:	falsa, perché è obbligatoria la frequenza di un corso di formazione ad hoc	falsa, perché bisogna avere un titolo di studio afferente l'area medico-sanitaria.	vera: basta dimostrare di averlo studiato!
2217	In quale circostanza il primo soccorritore dovrebbe evitare di porre un soggetto incosciente in posizione laterale di sicurezza?	Nel caso in cui il paziente sia affetto da disabilità motoria	In caso di sospette lesioni a carico del cranio o della colonna vertebrale	In presenza di perdita di sangue dal naso e dalla bocca
2218	Un condizione straordinaria che determina pericolo di vita e che rende necessario l'intervento terapeutico o ricorso a speciali mezzi di trattamento sanitario è una:	nessuna delle altre risposte	emergenza	situazione non urgente
2219	Nel controllo del respiro, per il primo soccorso, bisogna anche stimare:	quante respirazioni fa la vittima in un quarto d'ora	quante respirazioni fa la vittima in un' ora	quante respirazioni fa la vittima in un minuto
2220	Quali sono i principali sintomi che permetterebbero di diagnosticare rapidamente un disturbo cardiaco da angina pectoris?	dolore avuto allo sterno e al braccio sinistro, respiro affannoso, colorito cereo, labbra bluastre	dolore acuto o senso di oppressione al petto, braccio sinistro dolente, respiro superficiale	dolore acuto alla testa e al collo, respiro affannoso
2221	L'insieme delle tecniche mediche, chirurgiche e farmaceutiche che vengono messe in atto da personale medico qualificato è:	il pronto soccorso	l'emergenza socio-sanitaria	il primo soccorso
2222	In caso di svenimento e di polso debole bisogna:	far sollevare il torso del soggetto	mantenere disteso il soggetto	far sollevare le gambe del soggetto svenuto
2223	Chi si occupa del Pronto Soccorso?	Un qualunque cittadino esperto.	Il soccorritore.	Il personale sanitario.
2224	Se si sospetta una frattura della colonna vertebrale è fondamentale:	tenere immobile il soggetto	far muovere il soggetto	fare un massaggio cardiaco al soggetto
2225	Dopo una brutta caduta, un bambino riporta una frattura all'avambraccio destro, e, a causa del dolore, mostra una forte agitazione. Qual è la prima operazione che il primo soccorritore dovrebbe fare in attesa dell'arrivo dei soccorritori paramedici?	nessuna operazione in particolare	rimettere l'arto in posizione corretta manipolando le ossa	immobilizzare l'arto fratturato con cautela, impiegando una o più stecche rigide e una fascia
2226	In Italia, il Numero Unico di Emergenza:	è lo stesso sia per chiamate da cellulari che da telefono fisso	cambia a seconda se si chiama da un telefono fisso o da cellulare	non esiste un numero unico di emergenza
2227	Il vigente Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro impone che:	i datori di lavoro scelgano, a proprio giudizio, di quali materiali di soccorso devono dotarsi	i posti di lavori devono essere dotati di infrastrutture e materiale di soccorso idonei alle emergenze	i posti di lavori devono essere dotati di materiale di soccorso solo se hanno più di 100 dipendenti
2228	Il numero degli addetti al primo soccorso in un'azienda dipende:	dal numero complessivo dei dipendenti	dal volume di fatturato	dal tipo di produzione che realizza
2229	Un'ostruzione delle vie aeree:	è sempre completa	è sempre parziale	può essere completa o parziale
2230	In caso di puntura da insetti:	si deve strofinare la parte interessata	non si deve strofinare la parte interessata	si deve strofinare la parte interessata senza cospargerla di ammoniaca
2231	Se lo svenimento è dovuto al caldo o ad altre cause ambientali bisogna:	allontanare il soggetto dal luogo dell'evento	tenere steso il soggetto sul luogo dell'evento	tenere il soggetto con le gambe alzate su uno sgabello
2232	Secondo l'attuale normativa l'uso del defibrillatore semiautomatico è consentito:	ai soli infermieri	ai soli medici	a medici, infermieri e personale non sanitario qualificato
2233	Caldo o freddo, sostanze chimiche, elettricità sono tutte cause di:	lussazioni	distorsioni	ustioni
2234	Tra l'altro, si possono distinguere le emorragie:	solo arteriose	venose e arteriose	solo venose
2235	Quale scopo generale persegue il pronto soccorso?	Salvare la vita di bambini, donne e anziani	L'assistenza ai più indigenti	Salvare la vita, attenuare il dolore o il peggioramento di una malattia o trauma
2236	L'insieme degli atti che personale non medico può mettere in atto in attesa dell'arrivo di personale più qualificato è:	il primo soccorso	il primo soccorso socio-assistenziale	il pronto soccorso
2237	Un'ustione da fuoco, di primo o di secondo grado, deve essere trattata	con prodotti farmaceutici specifici e applicando garze pulite sulla parte lesa	frizionando la parte lesa con abbondante olio di oliva	lavando la parte lesa con acqua fredda.

N.	Domanda	A	B	C
2238	I materiali presenti nella cassetta di pronto soccorso devono essere:	reintegrati anche se non si usano	solo reintegrati perché se non si usano non c'è bisogno di controllarli	periodicamente controllati
2239	La contusione va trattata in primo intervento con:	impacchi freddi e fasciatura della parte per qualche settimana	immobilizzazione con fasce e bende per 10 giorni	docce fredde
2240	Chi presta il primo soccorso in caso di lussazione:	deve valutare caso per caso	deve sempre cercare di ridurre la lussazione	non deve mai cercare di ridurre l'articolazione
2241	Come bisogna intervenire in caso di emorragia esterna?	con la tecnica antishock	con emostasi con laccio o compressione digitale dell'arteria interessata	con il massaggio cardiaco e respirazione artificiale bocca a bocca
2242	Quali sono i sintomi che permettono di diagnosticare correttamente uno stato di incoscienza?	il soggetto compie azioni pericolose per sé e per gli altri	il soggetto non risponde agli stimoli vocali ma è sensibile agli stimoli fisici	il soggetto non risponde a nessuno stimolo, né vocale né fisico
2243	Quale posizione si ritiene più opportuna nel primo soccorso di un ferito:	posizione di decubito prono-laterale, con il capo flesso.	posizione seduta.	posizione di decubito, con le gambe sollevate in aria.
2244	In cosa consiste la Manovra di Heimlich?	È una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree.	È una tecnica semeiologica di particolare utilità nel caso di tubercolosi	È una tecnica a promuovere l'espulsione della placenta
2245	La prima cosa da fare è far sedere il colpito con la schiena eretta e con la testa flessa in avanti e fargli stringere le narici tra le dita. Ci riferiamo a un intervento in caso di:	epistassi	entrambe le altre risposte	rinoraggia
2246	Per ossigenare il sangue pompato in modo meccanico, bisogna effettuare:	la manovra di Heimlich	la respirazione bocca a bocca	la manovra di G.A.S.
2247	Nel caso di avvelenamento da antiparassitari occorre:	evitare di far ingerire latte o grassi	far subito bere latte	far ingerire qualsiasi tipo di grassi perché impediscono l'assorbimento delle sostanze
2248	Il protocollo di intervento in caso di folgorazione prevede:	utilizzare materiale isolante	interruzione del flusso elettrico	entrambe le altre risposte
2249	Cosa si intende per manovra MO.TO.RE.?	la riattivazione del circolo sanguigno periferico attuata muovendo gli arti inferiori del ferito	la manipolazione effettuata per verificare danni all'asse cranio-atlante-epistrofeo	la verifica di presenza di movimenti, tosse e respiro
2250	Una situazione ordinaria che necessità di trattamento medico ma che non richiede nessuna priorità è una:	emergenza	situazione non urgente	situazione urgente

2101 C	2118 C	2135 C	2152 B	2169 A	2186 A	2203 B	2220 B	2237 A
2102 A	2119 C	2136 C	2153 A	2170 A	2187 B	2204 A	2221 A	2238 C
2103 A	2120 C	2137 A	2154 B	2171 C	2188 C	2205 A	2222 C	2239 C
2104 C	2121 B	2138 B	2155 B	2172 B	2189 B	2206 C	2223 C	2240 C
2105 A	2122 C	2139 A	2156 B	2173 C	2190 B	2207 C	2224 A	2241 B
2106 B	2123 C	2140 C	2157 A	2174 A	2191 B	2208 A	2225 C	2242 C
2107 C	2124 A	2141 B	2158 C	2175 A	2192 A	2209 C	2226 A	2243 A
2108 C	2125 A	2142 C	2159 A	2176 B	2193 A	2210 B	2227 B	2244 A
2109 C	2126 A	2143 B	2160 B	2177 B	2194 B	2211 C	2228 A	2245 B
2110 C	2127 B	2144 A	2161 A	2178 A	2195 C	2212 B	2229 C	2246 B
2111 C	2128 A	2145 A	2162 C	2179 A	2196 B	2213 A	2230 B	2247 A
2112 A	2129 C	2146 A	2163 C	2180 C	2197 A	2214 A	2231 A	2248 C
2113 B	2130 C	2147 B	2164 C	2181 B	2198 C	2215 C	2232 C	2249 C
2114 A	2131 A	2148 C	2165 C	2182 B	2199 A	2216 A	2233 C	2250 B
2115 C	2132 A	2149 C	2166 B	2183 B	2200 C	2217 B	2234 B	
2116 A	2133 A	2150 A	2167 A	2184 B	2201 A	2218 B	2235 C	
2117 A	2134 C	2151 B	2168 C	2185 C	2202 A	2219 C	2236 A	